BUTTERMIX Ca Mg

PREVIENE LE FISIOPATIE LEGATE ALLA CARENZA CALCIO/MAGNESIO
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
AUMENTA LA CONSERVABILITÀ
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BUTTERMIX Ca Mg è una soluzione concentrata di Calcio e Magnesio purissimi, la cui azione specifica viene sinergizzata dalla presenza di una matrice organica contenente amminoacidi ed oligoelementi.
BUTTERMIX Ca Mg è il formulato che cura e previene le principali fisiopatie legate ai disordini nutrizionali causati dalla carenza di Calcio e Magnesio. Tali fisiopatie si verificano nel periodo cruciale dell'accrescimento dei frutti e sono caratterizzate da disseccamenti, necrosi, fessurazioni e imbrunimenti. Colpiscono sia le colture orticole quali pomodoro, melone, cocomero, lattughe, sedano e carota, che le colture frutticole quali Pomacee, Drupacee, Vite e Actinidia. La regolare applicazione di BUTTERMIX Ca Mg rimane il mezzo più efficace da adottare per la prevenzione e la cura di tali manifestazioni. Il suo regolare impiego consente di migliorare la qualità delle produzioni e di garantirne una migliore conservabilità.

COLTURA	MOMENTO DI APPLICAZIONE	DOSE/ETTARO*
Vite	Alla scamiciatura, 2 applicazioni distanziate di 10 – 15 giorni. Ripetere 15-20 giorni prima dell'invaiatura	4-6 kg
Drupacee (Susino, Pesco, Nettarina, Ciliegio, Albicocco) e Pomacee (Pero, Melo, Cotogno)	Da frutticino evidente fino all'invaiatura, 5-8 trattamenti ogni 10-12 giorni	4-6 kg
Actinidia	Da post-allegagione, 4-5 trattamenti ogni 10-15 giorni	4-6 kg
Piccoli frutti (Ribes, More, Mirtilli, Lamponi) e Fragola	Da post-allegagione, 2-3 trattamenti ogni 10-12 giorni	4-6 kg
Orticole da frutto (Zucca, Zucchino, Pomodoro, Peperone, Melone, Melanzana, Cetriolo, Anguria)	A partire dalla pre-fioritura, 3-4 trattamenti a distanza di 10-12 giorni	4-6 kg
Orticole da foglia (Spinacio, Sedano, Scarola, Rucola, Radicchio, Lattuga, Cicoria)	A partire da 8-10 giorni dopo il trapianto, 3-4 trattamenti a distanza di 10-12 giorni	4-6 kg
Orticole varie (Porro, Patata, Finocchio, Cipolla, Cavolfiore, Cavolo, Broccolo, Aglio)	Da piante sviluppate, 3-4 trattamenti a distanza di 10-12 giorni	4-6 kg
Poinsettia	Dalla formazione delle brattee, 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni	2-4 kg

COMPOSIZIONE	
Azoto (N) organico	3.40%
Carbonio (C) di origine biologica	10.00%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	10.00%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2.00%
Boro (B) solubile in acqua	0.05%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0.20%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0.20%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0.01%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0.05%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0.05%

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
LIQUIDO	
pH (sol 1%)	6.6
Conducibilità E.C. µS/cm (1‰)	790
Densità (g/cm^3)/Peso specifico	1.34
MODO D'USO	
	Concimazione Fogliare

CONFEZIONE: 6 - 12 - 25 KG

AVVERTENZE: Non mescolare mai nella stessa vasca/contenitore fertilizzanti contenenti Fosforo e/o Solfati con fertilizzanti contenenti Calcio. In presenza di acqua di irrigazione contenente alti contenuti di Fosforo, è necessario acidificare prima di utilizzare fertilizzanti contenenti Calcio.

La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.