NEMASPOR GR 1036

Adriatica

ENRICHIT LA POPULATION MICROBIENNE DE LA RHIZOSPHÈRE
FAVORISE LA SOLUBILISATION DES ÉLÉMENTS
FOURNIT DES NUTRIMENTS AU SOL
FAVORISE LA RHIZOGÉNÈSE ET L'ABSORPTION RACINAIRE
SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT DES PLANTES DANS DES CONDITIONS DÉFA

NEMASPOR GR 1036 est un engrais microgranulé bioactivé contenant un consortium de micro-organismes composé de:
- champignons endomycorhiziens du genre Glomus, capables d'établir une relation symbiotique avec la plante dans la rhizosphère ;
- champignons antagonistes du genre Trichoderma, capables de produire des antibiotiques et d'agir comme agents de perturbation pour la croissance d'autres champignons pathogènes ;
- bactéries de la rhizosphère du genre Bacillus, qui stimulent la croissance du système racinaire, ainsi qu'inhibent le développement de certains phytopathogènes.

Grâce à l'action synergique des différents micro-organismes et à leur présence en grande quantité, NEMASPOR GR 1036 agit comme un "bioactivateur" de la rhizosphère, en augmentant son activité microbienne et en améliorant la disponibilité des nutriments. Cela détermine un plus grand développement du système racinaire et une augmentation de l'efficacité d'absorption des nutriments et de l'eau par la plante, avec une augmentation conséquente de la luxuriance végétative et une stimulation générale de la croissance. Les effets bénéfiques de l'application de NEMASPOR GR 1036 et de la "bioactivation" de la rhizosphère se traduisent également par les niveaux de résistance endogène des plantes, plus tolérantes aux stress abiotiques, c'est-à-dire à des conditions climatiques et/ou pédologiques défavorables.
L'application de NEMASPOR GR 1036 permet de maintenir et de régénérer l'équilibre de la biodiversité microbiologique des sols.

COLTURE	MOMENT DE LA DEMANDE	DOSE/HECTARE*
Pomacées (Pommier, Poirier, Cognassier), Drupacées (Nectarine, Pêcher, Prunier, Abricotier, Cerisier), Olivier, Vigne, Agrumes (Mandarinier, Citronnier, Oranger, Bergamotier, Clémentine) e Kiwi	À la transplantation ou à la reprise végétative	50 kg
Fruits rouges (Groseilles, Mûres, Myrtilles, Framboises) e Fraise	À la transplantation ou à la reprise végétative	50 kg
Légumes-fruits (Potiron, Courgette, Tomate, Poivron, Melon, Aubergine, Concombre, Pastèque)	Localisé à la transplantation	50 kg
Cultures industrielles (Tabac, Soja, Tomate d'industrie, Tournesol, Coton, Colza, Canne à sucre, Betterave)	Localisé à la transplantation	50 kg
Cultures des fleurs et plantes ornementales	Localisé à la transplantation	50 kg

COMPOSITION	
Azote (N) total	10.00%
Azote (N) organique	2.00%
Azote (N) ammoniacal	8.00%
Carbone (C) d'origine biologique	7.50%
Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau	34.50%
Anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau	36.00%
Bore (B) total	0.10%
Molybdène (Mo) total	0.002%
Zinc (Zn) total	0.80%

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES			
MICROGRANULÉ			
pH (sol 1%)			5.7
Conductivité E.C. µS/cm (1‰)			655
Densité (g/cm^3)/Poids spécifique			0.88
Granulométrie (mm)			0.8-1.2
MODE D'UTILISATION	Fertilisation de coverture	Fertilisation localisée au semis/transplantation	Intégration de subtrats

EMBALLAGE: 15 KG - PALLET 900 KG

Le choix de la dose est subordonné à divers facteurs et peut être modifié si nécessaire. Toutes les applications peuvent être répétées en fonction des différents besoins des cultures. Vous pouvez contacter notre service technique pour connaître l'application correcte sur sols et conditions climatiques spécifiques.