

MIGLIORA L' ASSIMILABILITÀ DEI NUTRIENTI FAVORISCE LO SVILUPPO EQUILIBRATO DELLE COLTURE TUTELA E FAVORISCE LA FERTILITÀ DEL TERRENO

HUMIFILL L è una sospensione altamente concentrata di sostanze umiche attive, costituite da un complesso humoproteico. L'appropriata presenza di acidi umici e fulvici, in un equilibrato rapporto, fa di HUMIFILL L un formulato dall'impiego efficace sia a livello fogliare, sia a livello radicale.

A livello fogliare HUMIFILL L svolge una funzione nutritiva diretta, per la presenza di nutrienti in forma organica e prontamente disponibili ed un'azione indiretta, consistente nell'aumento della permeabilità esercitata sulle membrane cellulari che agevola, a sua volta, l'assunzione epigea di macro e microelementi. A livello radicale HUMIFILL L induce una più intensa attività rizogena e aumenta la Capacità di Scambio Cationico (C.S.C), migliorando la disponibilità degli elementi già presenti, in particolare Fosforo e Ferro.

HUMIFILL L può essere impiegato per limitare eventuali disordini provocati da antiparassitari ed erbicidi; in questo caso si consiglia l'associazione con RA.AN L 13186.

| COLTURA | MOMENTO DI APPLICAZIONE | DOSE FOGLIARE* | DOSE FERTIRRIGAZIONE* |
|---|--|----------------|-----------------------|
| Actinidia, Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarina, Pesco, Susino), Agrumi (Arancio, Bergamotto, Clementina, Limone, Mandarino), Pomacee (Cotogno, Melo, Pero), Olivo e Vite | In pre- e post-fioritura, ad ingrossamento frutto | 3-5 kg | 25-50 kg |
| Fragola | Alla ripresa vegetativa, in pre-fioritura | 3-5 kg | 25-50 kg |
| Nocciolo e Noce | Dalla ripresa vegetativa ad ingrossamento frutto | 3-5 kg | 25-50 kg |
| Orticole da frutto (Anguria, Cetriolo, Melanzana, Melone, Peperone, Pomodoro, Zucchini, Zucca) | Da post-emergenza o post-trapianto, con cadenza di 8-10 giorni | 3-5 kg | 25-50 kg |
| Orticole da foglia (Cicoria, Lattuga, Radicchio, Rucola, Scarola, Sedano, Spinacio) | Da post-emergenza o post-trapianto fino alla raccolta, con cadenza di 10-15 giorni | 3-5 kg | 25-50 kg |
| Colture industriali (Barbabetola, Canna da zucchero, Colza, Cotone, Girasole, Pomodoro da industria, Soia, Tabacco) | Dai primi stadi vegetativi | 3-5 kg | 25-50 kg |
| Colture floricole ed ornamentali | Da trapianto o emergenza, con cadenza di 8-10 giorni | 3-5 kg | 25-50 kg |

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

LIQUIDO

| | |
|---|------|
| pH (sol 1%) | 8.30 |
| Conducibilità E.C. S/cm (1‰) | 133 |
| Densità (g/cm ³)/Peso specifico | 1.10 |

MODO D'USO



Concimazione Fogliare



Fertirrigazione

CONFEZIONE: 5 - 25 KG

NOTA: HUMIFILL L può essere impiegato anche per la concia dei semi, in particolare di soia, riso, patata, mais e frumento:

- Semi piccoli: 0,8 - 1 Kg per quintale di seme;
- Semi voluminosi: 0,4-0,5 Kg per quintale di seme.

HUMIFILL L può essere somministrato sui residui colturali (stocchi mais, stoppie di frumento, di soia, foglie e coltetti di barbabietola) per favorire una più rapida umificazione della sostanza organica. La dose di impiego è di 8 - 10 Kg/ha distribuendolo in modo uniforme, prima dell'aratura, sulla massa dei residui opportunamente tritati.

La scelta del dosaggio è subordinata a vari fattori e può essere variata secondo necessità. Tutti gli interventi possono essere ripetuti in relazione alle diverse necessità delle colture. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Nostro Servizio Tecnico.